

CORONAVIRUS



RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE PACIENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS

**PROVINCIA
DE SANTA FE**



COMITÉ TÉCNICO COVID-19
Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

COMITÉ TÉCNICO COVID-19

RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE PACIENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS

Las medidas de prevención sugeridas para pacientes onco-hematológicos están dirigidas a:

- **Evitar el contacto con casos que realizan cuarentena y/o sospechosos y/o confirmados de COVID-19**, así como también **niños que estén sanos**, pero que hayan estado en contacto con esta población.
- Sugerir el **aislamiento en su domicilio** dentro de lo posible, dependiendo de la evolución del brote local.
- Mantener estrictamente las medidas de **higiene de manos, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia, distanciamiento social, evitar tocarse la cara (nariz, boca y ojos)**, no auto-meducarse.

Las medidas sugeridas a los médicos que atienden pacientes onco-hematológicos:

- Indicar las **inmunizaciones correspondientes** según corresponda a los **pacientes** como a sus **familiares (antigripal anual, antineumococcica, etc)**
- Programar los **controles** y / o atenciones en los consultorios con **mayor margen de horario** para evitar la aglomeración de personas en sala de espera y de los pacientes cuya atención es impostergable.
- **Realizar limpieza frecuente de las superficies** de mayor contacto del consultorio (picaportes, pasamanos, posa-brazos de sillones, baños, etc.) pudiendo utilizar **pulverizador** con solución de **alcohol al 70%**.
- En el caso de los pacientes en plan de trasplante de médula ósea se recomienda evaluar **aplazar** el mismo siempre que lo permita su enfermedad de base (ej : mieloma multiple, etc).

Manejo de pacientes con cuadros respiratorios:

- Se recomienda la atención teledirigida y la mínima concurrencia a los centros de salud, dentro de lo posible.
- El manejo de la infección por COVID-19 es principalmente de sostén, aunque en infecciones respiratorias bajas se están estudiando diferentes tratamientos (lopinavir/ritonavir, ribavirina, hidroxichloroquina, darunavir/cobistat , remdesivir e interferon alpha y beta) que aún están en investigación.
- El paciente con infección por COVID-19 se aplazará el trasplante de médula ósea por tiempo a determinar, si su patología lo amerita, y en pacientes con alto riesgo de enfermedad, el trasplante debe diferirse hasta que el paciente **esté asintomático** y tenga **tres PCR de virus repetidas negativas, una por semana (aplazamiento mínimo 14 días)**

COMITÉ TÉCNICO COVID-19

- Paciente con contacto cercano con paciente con infección con COVID-19, debe esperar 14 y preferentemente 21 días para cualquier procedimiento como movilización, cosecha o acondicionamiento.

Recomendaciones para el donante:

- Si el donante presentó infección por COVID-19 se debe excluir al menos tres meses de ser donante. Si estuvo en contacto con paciente con COVID-19 el donante debe ser excluido por 28 días y ser seguido para descartar infección respiratoria durante ese periodo. En caso de viaje reciente de área de circulación viral, también se excluirá 28 días.
- El donante debe ser aconsejado y controlado para evitar una infección por COVID-19 las 4 semanas previas a la colecta, según las recomendaciones habituales para la población.

Bibliografía:

Coronavirus disease COVID-19: Updated EBMT recommendations (8th march 2020)

Se debe respetar las guías de recomendaciones del Ministerio de Salud de la República Argentina (<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19>) y estas pueden ir cambiando diariamente según la evolución del brote y declaraciones de entidades de salud internacional (<https://www.who.int/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>).